

Andere medische aandoeningen:

Huidige medicatie:

Geneesmiddelen om mee op te letten

Omdat ik MG heb, loop ik het risico op verhoogde spierzwakte als bepaalde geneesmiddelen worden voorgeschreven. **Lees de informatie over “Geneesmiddelen om mee op te letten”**

Voor vragen over geneesmiddelen, neem contact op met mijn MG-arts:

Naam

Telefoon

of

Raadpleeg uw arts of apotheker. Er wordt gemeld dat verschillende aanvullende geneesmiddelen spierzwakte bij incidentele patiënten met MG kunnen verergeren. De MG-patiënt en arts moeten op deze mogelijkheid letten wanneer een nieuw geneesmiddel wordt voorgeschreven.

Uitgebreidere en actuele informatie over de effecten van geneesmiddelen bij MG vindt u op onze website myasthenia.org.



© Myasthenia Gravis Stichting van Amerika, (MGFA) www.myasthenia.org

Herzien in 2020

! NOODWAARSCHUWINGSKAART !

Ik heb **myasthenia gravis (MG)**, een ziekte die me zo zwak kan doen voelen dat ik moeite kan hebben met staan of duidelijk spreken. Daarnaast heb ik mogelijk hangende oogleden, dubbel zicht, en zelfs moeite met ademen of slikken. Soms worden deze symptomen verward met intoxicatie. Als mijn ademhalings- en slikproblemen ernstig zijn, heb ik mogelijk een "MG-crisis".

Als het lijkt alsof ik hulp nodig heb, bel dan a.u.b. mijn noodcontact en 911.

MIJN NAAM

Geboortjaar

Adres

Stad

Provincie

Postcode

Telefoon

of

CONTACT VOOR NOODGEVALLEN

Naam

Relatie

Telefoon

of

BEHEER VAN DE EERSTE HULPVERLENER

Ernstige ademhalingsmoeilijkheden

(klachten zoals kortademigheid in rust, moeite met praten behalve in korte zinnen, angst, rusteloosheid, naar lucht happen, vermoeidheid en onvermogen om plat te liggen, zwakke hoest):

- houd de luchtwegen open.
- zuig gepoolde orale secreties af.
- ondersteun de ademhaling indien nodig met een ambu-ballon of niet-invasieve beademing, indien beschikbaar.
- Ademhalingsmoeilijkheden bij MG zijn gerelateerd aan diafragmatische zwakte. *Pulsoximetrie is geen betrouwbare meting van de ademhalingsstatus.*

Ernstige slikproblemen

(klachten zoals stikken, kokhalzen, neusregurgitatie, niet kunnen doorslikken van voedsel, medicijnen of speeksel):

- Open de mond bij actieve verstikking en verwijder zichtbare voedseldeeltjes.
- Voeren het Heimlich-manoeuvere uit als een obstructie door een vreemd lichaam (inclusief voedsel) van de luchtwegen wordt vermoed.
- Houd de luchtwegen open.
- zuig gepoolde orale secreties af.
- Houd een rustige en vredige sfeer.
- Zorg dat de patiënt rechtop staat als hij/zij alert is.

GENEESMIDDELEN OM MEE OP TE LETTEN BIJ MG

- **Telithromycine:** antibioticum voor buiten het ziekenhuis opgelopen longontsteking. De Amerikaanse FDA heeft een "black box"-waarschuwing voor het gebruik van dit geneesmiddel bij MG. *Mag niet worden gebruikt bij MG.*
- **Fluorochinolonen** (bijv. ciprofloxacin, moxifloxacin en levofloxacin): vaak voorgeschreven breed spectrum antibiotica die geassocieerd worden met verergering van MG. De Amerikaanse FDA heeft een "black box"-waarschuwing voor deze geneesmiddelen bij MG. *Indien u dit gebruikt, is voorzichtigheid geboden.*
- **Botulinetoxine:** *te vermijden.*
- **D-penicillamine:** Gebruikt voor de ziekte van Wilson en zelden voor reumatoïde artritis. Sterk geassocieerd met het veroorzaken van MG. *te vermijden.*
- **Chloroquine** (Aralen): Gebruikt voor malaria- en amoeba-infecties. Kan MG verergeren. *Met voorzichtigheid gebruiken.*
- **Hydroxychloroquine** (Plaquenil): Gebruikt voor malaria, reumatoïde artritis en lupus. Kan MG verergeren. *Met voorzichtigheid gebruiken.*
- **Quinine:** af en toe gebruikt voor beenkrampen. *Gebruik verboden, behalve bij malaria in de VS.*
- **Magnesium:** potentieel gevaarlijk bij intraveneuze toediening, d.w.z. voor eclampsie tijdens de late zwangerschap of voor hypomagnesiëmie. *Alleen gebruiken als dit absoluut noodzakelijk is* en opletten voor verslechtering.

- **Macrolide antibiotica** (bijv. erytromycine, azitromycine, claritromycine): vaak voorgeschreven antibiotica voor gram-positieve bacteriële infecties. Kan MG verergeren. *Indien u dit gebruikt, is voorzichtigheid geboden.*
- **Aminoglycoside-antibiotica** (bijv. gentamycine, neomycine, tobramycine): wordt voorgeschreven voor gram-negatieve bacteriële infecties. Kan MG verergeren. *Wees voorzichtig als er geen alternatieve behandeling beschikbaar is.*
- **Corticosteroïden:** Een standaardbehandeling voor MG, maar kan de eerste twee weken een voorbijgaande verslechtering veroorzaken. *Let goed op* voor deze mogelijkheid.
- **Procainamide:** wordt voorgeschreven voor onregelmatig hartritme. Kan MG verergeren. *Met voorzichtigheid gebruiken.*
- **Desferrioxamine:** een chelaatvormer die wordt voorgeschreven voor hemochromatose. *Kan MG verergeren.*
- **Bètablokkers:** vaak voorgeschreven voor hypertensie, hartziekte en migraine, maar mogelijk gevaarlijk bij MG. Kan MG verergeren. *Wees voorzichtig met het gebruik.*
- **Statines** (bijv. atorvastatine, pravastatine, rosuvastatine, simvastatine): worden voorgeschreven om serumcholesterol te verlagen. Kan MG verergeren. *Wees voorzichtig met het gebruik indien geïndiceerd en met de laagste dosis die nodig is.*
- **Jodiumhoudende radiologische contrastmiddelen:** oudere rapporten documenteren verhoogde MG-zwakte, maar moderne contrastmiddelen lijken veiliger. *Wees voorzichtig en let op verslechtering.*

Deze lijst is niet volledig.